

<p>УЗИ почек и мочевого пузыря</p>	<p>Полноценное исследование выполнимо только при наполненном мочевом пузыре Примерно за 1,5 - 2 часа до времени предполагаемого УЗИ ребенок должен помочиться, а затем - выпить воды. Вместо воды можно дать чай, компот, но только не газировку и не молоко. Пить в идеальном варианте лучше через трубочку, чтобы поменьше глотать воздуха. Количество выпитой жидкости примерно следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-2 года - сколько выпьет (можно из соски - только лучше), постараться - не менее 100 мл (полстакана); • 3-7 лет - 1 стакан; • 8-11 лет - полтора стакана; • подростки - 2 стакана. <p>И больше - не пить и не мочиться до УЗИ. Если Ваш ребенок имеет необычное телосложение (очень крупный или, наоборот, очень маленький), то количество жидкости надо подобрать индивидуально. И не надо забывать, что сначала ребенок должен помочиться, а только затем - пить воду!</p>
<p>Нейросонография УЗИ щитовидной железы УЗИ тазобедренных суставов Эхокардиография УЗИ сосудов головного мозга ребенка (доплерография сосудов, дуплексное исследование)</p>	<p>Не требует подготовки. Единственное условие - ребенок должен лежать спокойно, поэтому малышей обычно смотрят после еды, они сытые, довольные, лежат хорошо, а некоторые - просто спят.</p>
<p>УЗИ желчного пузыря + нагрузка</p>	<p>Строго натощак. С собой иметь 200 г питьевого йогурта.</p>

Подготовка детей к ФГДС

Процедура ФГДС у детей как правило проводится утром натощак. Последний прием пищи должен происходить не менее чем за 8-10 часов до исследования

Подготовка к ЭЭГ(электроэнцеелография)

Для детей разного возраста ЭЭГ проводится по-разному и требуют различной подготовки.

- Детям первого года жизни ЭЭГ проводится на руках у мамы во время дневного сна, между кормлениями, чтобы ребенок был спокоен и не плакал. На головку малышу надевается мягкая шапочка с подключенными к ней электродами, которые фиксируют показатели мозговой активности и проецируют их на экран. До исследования ребенку не следует давать спать. Необходимо взять с собой пустышку и бутылочку со смесью (если малыш на искусственном вскармливании) или сцеженное грудное молоко при естественном вскармливании.

- С детьми от года до 3 рекомендуется провести до предварительную подготовку, накануне не смотреть телевизор и чтобы ребенок был спокоен и не голоден перед исследованием, научиться глубоко дышать, взять с собой вкусное питье и любимую игрушку. Лаборант также поможет расслабить ребенка, поиграет с ним в «прятки» и в «космонавтов».

ЭЭГ не проводится :

- при насморке и кашле
- если на голове есть повреждения или средства для укладки
- с сережками в ушах у девочек.